

Tisztelt Lakosság!!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei folyamatosan figyelemmel kísérik a hazai és nemzetközi növényegészségügyi helyzetet, elemzik a magyar növényvilágot érintő kockázatokat. E tevékenységünkhöz kapcsolódóan ezúton szeretnénk felhívni figyelmét a magyarországi borvidékeket egyre súlyosabban fenyegető szőlő aranyszínű sárgaság betegség (*Grapevine flavescence dorée, FD*) veszélyére.

A már 15 borvidékünkön jelenlévő betegség rendkívül komoly növényegészségügyi és gazdasági kockázatot jelent a hazai szőlőtermelésre: a terméshozamot akár 50%-kal csökkentheti, de bizonyos fajtáknál teljes pusztulásához is vezethet.

Településük egy, a *betegséggel már érintett borvidéken vagy annak közelében* található. Emiatt kiemelten fontos, hogy minden helybéli szőlőtermesztő megtegye a szőlő aranyszínű sárgaság mielőbbi felszámolásához és a terjedés megakadályozásához szükséges intézkedéseket. Kérjük, hogy segítsék borvidékük mentesítését és a védekezést az alábbi információk, valamint a több formátumban is letölthető figyelemfelhívó plakátunk helyben szokásos módon történő megosztásával.

#### Legfontosabb tudnivalók a szőlő aranyszínű sárgaságról

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség kórokozója az emberre nem veszélyes, ugyanakkor a szőlőtőkék terméshozamát akár 50%-kal csökkentheti és a szőlőtőkék teljes pusztulásához is vezethet.

Főként két módon terjed:

- fertőzött szaporítóanyaggal, valamint
- az amerikai szőlőkabóca vektor segítségével, amely a fertőzött növényről az egészséges szőlőre átszállva viszi tovább a kórokozót.

A betegség ellen hatékony növényvédő szer nincs. A terjedése azonban megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni célzott rovarölőszeres védekezéssel. Ehhez az alkalmazható készítmények listája elérhető a Nébih honlapján (<https://portal.nebih.gov.hu/amerikai-szokaboca>). Azokon a területeken, ahol a védekezés elmarad, a betegség gyorsan terjed: évente megtízszereződhet a fertőzött szőlőnövények száma és a tőkék akár 80–100%-a is megfertőződhet a fitoplazmával.

A megelőzés másik kulcsfontosságú eleme, hogy kizárólag ellenőrzött helyről származó szaporítóanyagot ültessenek a hobbikertészek és a gazdák egyaránt.

A szőlő aranyszínű sárgaság betegség ún. karantén károsítónak számít az EU-ban (2019/2072/EU II. melléklet B része). Megjelenése esetén hatósági intézkedések is életbe lépnek, azonban azok nem érintik a bor készítését és annak forgalmazását.

A Nébih tematikus aloldalán a betegséggel kapcsolatos minden fontos információ elérhető:  
<https://portal.nebih.gov.hu/novenyegeszsegugy>

A figyelemfelhívó plakát A4-es és A3-as méretben, fekete-fehér és színes formátumban egyaránt letölthető az alábbi oldalról: [Szőlő aranyszínű sárgaság plakátok](#)

Hazánk több területe, köztük az északi, történelmi borvidékek még mentesek a betegségtől. Ezt az állapotot azonban csak összefogással és időben megtett intézkedésekkel tudjuk megőrizni. Köszönjük, hogy a helyi lakosok és különösen a szőlőtermesztők figyelmének felhívásával, az információk megosztásával Önök is segítik a növényegészségügyi szakemberek munkáját.

Üdvözlettel,

Szűcs Csaba

*igazgató*

*Növényvédelmi Igazgatóság*

*Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal*